


موضوع في مدياكتك مادة الرياضيات: (10 نقط)

الجزء الأول:

معتادا على فحوى الوثيقة التالية:

الخطوة تمهيدية



تكون زاوية $\widehat{A\alpha}$ زاوية حادة.
تكون E نقطة من (Ax) و F مسقطها العمودي على المستقيم (Ay)

ضع : $\frac{EF}{AF} = h$ و $\frac{EF}{AE} = a$

تكون M و M' نقطتين من (Ax) مختلفتان عن A و E.
تكون N و N' مسقطيهما العموديين على (Ay) .

بين أن : $\frac{MN}{AM} = \frac{M'N'}{AM'}$

العدد a غير مرتبط بوضع E على (Ax) ومسقطها F على (Ay) ، يسمى جيب α ويرمز له بـ $a = \sin \alpha$
بين أن : $\frac{MN}{AN} = \frac{M'N'}{AN'}$. العدد b غير مرتبط بوضع E على (Ax) ومسقطها F على (Ay) يسمى $b = \tan \alpha$ ويرمز له بـ $b = \tan \alpha$

الخطوة 2

لتحديد القياس x لزاوية حادة حيث $\sin x = 0.456$ وذلك باستعمال المحسبة،

تبع الخطوات التالية : $\text{SHIFT} \quad \sin^{-1} \quad 0.456 \quad =$

27.12929416

النتيجة التي تظهر على شاشة المحسبة هي قيمة مقربة لقياس الزاوية x.
باستعمال المحسبة حدد قيمة مقربة لكل من a و b و c و c علمان :


$\tan c = 2$

$\tan b = \frac{2}{3}$

$\sin a = \frac{1}{4}$



الخطوة 3



ABC مثل قائم الزاوية في A حيث : $\widehat{ABC} = x$

(1) بين أن : $0 < \sin x < 1$

(2) احسب : $(\cos x)^2 + (\sin x)^2$

(3) بين أن : $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$

الخطوة 4

ABC مثل قائم الزاوية في A حيث : $AB = 3, AC = 4, BC = 5$

(1) احسب : $\cos \widehat{ABC}$ و $\sin \widehat{ABC}$ و $\tan \widehat{ABC}$ (2) احسب : $\cos \widehat{ACB}$ و $\sin \widehat{ACB}$ و $\tan \widehat{ACB}$

(3) ماذا تلاحظ ؟

- 1- حدد المستوى الدراسي المستهدف من هذه الأنشطة و عنوان الدرس.
- 2- حدد المفاهيم الأساسية التي تهدف إليها الأنشطة التمهيدية المعتمدة في هذه الوثيقة
- 3- أعط معالجة بيداغوجية لكل نشاط من الأنشطة الأربعة مع تحديد القدرات المستهدفة منه.


الجزء الثاني :

تتمحور الأنشطة المعتمدة بالوثيقة على مفهوم الزاوية الذي يعتبر من المفاهيم الأساسية في الهندسة حيث تتجسد هذه الأهمية من خلال عدد الدروس الواردة في البرامج والمقررات الرسمية بالتعليم الثانوي الإعدادي و التأهيلي التي نتناول هذا المفهوم.

- 1- أعط جردا لكيفية تطور مفهوم الزوايا في السلك الثانوي الإعدادي مع تحديد المستجدات المحدثة خلال هذا التطور.
- 2- حدد تعاريف و خاصيات المفاهيم التالية و ربطها بأهميتها في كل مستوى من مستويات التعليم الثانوي الإعدادي.
(أ) زاويتان متتامتين
(ب) زاويتان متقابلتان بالرأس
(ج) زاوية محيطية في دائرة
(د) زاوية مركزية في دائرة
(هـ) منصف زاوية
(ي) حالة تشابه مثلثات المرتبطة بالزوايا

الجزء الثالث :

تم اقتراح الشكل التالي لمستوى الثالثة إعدادي ضمن فترة الدعم و التقوية.



حيث: $ABCD$ مربع طول ضلعه 10cm و BCE مثلث متساوي الأضلاع

- 1- باستعمال الشكل حدد القيمة المضبوطة للعدد $\tan(15^\circ)$
- 2- أعط سلسلة من الأسئلة المتدرجة لاستنتاج $\tan(15^\circ)$ حتى تكون موضوع تقويم في الحساب المثلثي بالسنة الثالثة إعدادي.

موضوع في مادة الرياضيات: (10 نقط)

EXERCICE 1

Soient $a \in \mathbb{R}$ et une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de réels telle que :

$$u_0 = a \text{ et } \forall n \in \mathbb{N} : u_{n+1} = \sin(u_n).$$

Question 1 Pour toute valeur de a la suite (u_n) est :

- (a) croissante. (b) bornée. (c) convergente. (d) décroissante.

Question 2 Si (u_n) admet une limite (finie ou non), alors il est possible que cette limite vaut :

- (a) 1. (b) 0. (c) $\pi/2$. (d) $+\infty$.

Question 3 On pose $\gamma = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin^2(x)} - \frac{1}{x^2} \right)$, alors :

- (a) $\gamma = \frac{1}{6}$. (b) $\gamma = \frac{1}{3}$. (c) $\gamma = -\frac{1}{3}$. (d) $\gamma = -\frac{1}{6}$.

Question 4 On suppose $a = \frac{\pi}{4}$. On déduit de la question précédente que :

- (a) $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{\gamma}{n}$. (b) $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{\gamma n}$. (c) $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \sqrt{\frac{\gamma}{n}}$. (d) $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \sqrt{\frac{1}{\gamma n}}$.

EXERCICE 2

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, l'application φ_n est définie sur \mathbb{R} par :

$$\forall x \in \mathbb{R} : \varphi_n(x) = (1-x)^n e^{-2x}, \text{ et l'intégrale } I_n = \int_0^1 \varphi_n(x) dx.$$

Question 5 Les valeurs de I_0 et I_1 sont données par :

- (a) $I_0 = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}e^{-2}$ et $I_1 = -\frac{1}{4}e^{-2} + \frac{1}{4}$. (b) $I_0 = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}e^{-2}$ et $I_1 = \frac{1}{4}e^{-2} + \frac{1}{4}$.
(c) $I_0 = -\frac{1}{2} - \frac{1}{2}e^{-2}$ et $I_1 = -\frac{1}{4}e^{-2} + \frac{1}{4}$. (d) $I_0 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}e^{-2}$ et $I_1 = -\frac{1}{4}e^{-2} - \frac{1}{4}$.

Question 6 La suite (I_n)

- (a) est croissante. (c) tend vers $+\infty$ quand n tend vers $+\infty$.
(b) est décroissante. (d) est convergente.

EXERCICE 3

Soit la suite $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par :

$$\forall n \in \mathbb{N} : a_n = \frac{(-1)^n}{2n+1}.$$

Question 7 Pour tout $n \in \mathbb{N}$ on pose $S_n = \sum_{k=0}^n a_k$, alors :

- (a) la suite $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante. (c) la suite $(S_{2n+1})_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante.
(b) la suite $(S_{2n})_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante. (d) pour tout $n \in \mathbb{N} : S_n > 0$.

Question 8 Pour tout $k \in \mathbb{N}$, on pose $I_k = \int_0^1 t^{2k} dt$ de sorte que $S_n = \sum_{k=0}^n (-1)^k I_k$, alors :

- (a) $S_n = \int_0^1 \frac{dt}{1+t^2} + (-1)^{n+1} \int_0^1 \frac{t^{2n+2}}{1+t^2} dt.$ (c) $S_n = \int_0^1 \frac{dt}{1+t^2} + (-1)^n \int_0^1 \frac{t^{2n+1}}{1+t^2} dt.$
 (b) $S_n = \int_0^1 \frac{dt}{1+t^2} + (-1)^n \int_0^1 \frac{t^{2n+2}}{1+t^2} dt.$ (d) $S_n = \int_0^1 \frac{dt}{1+t^2} - (-1)^{n+1} \int_0^1 \frac{t^{2n+2}}{1+t^2} dt.$

Question 9 On en déduit que la suite $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$:

- (a) tend vers $+\infty$ quand n tend vers $+\infty$. (c) est convergente de limite égale à $\frac{\pi}{2}$.
 (b) est convergente de limite égale à $\frac{\pi}{4}$. (d) est convergente de limite égale à 1.

EXERCICE 4

Soit $P = a_n X^n + \dots + a_1 X + a_0$ un polynôme à coefficients entiers ($a_i \in \mathbb{Z}$) tel que $a_0 a_n \neq 0$.

Question 10 On suppose que P admet une racine $r = \frac{p}{q}$ avec $p \in \mathbb{Z}$, $q \in \mathbb{N}^*$ et $p \wedge q = 1$, alors :

- (a) p divise a_0 . (b) a_0 divise q . (c) q divise a_n . (d) a_n divise p .

Question 11 On pose $\alpha = \cos\left(\frac{\pi}{9}\right)$, on a :

- (a) α est racine du polynôme $8X^3 - 6X + 1$. (c) α est un irrationnel.
 (b) α est racine du polynôme $8X^3 - 6X - 1$. (d) α est racine du polynôme $6X^3 - 8X - 1$.

EXERCICE 5

On considère l'ensemble $\mathbb{E} = \left\{ \begin{pmatrix} a & a \\ a & a \end{pmatrix} \mid a \in \mathbb{R}^* \right\}$.

Question 12 On note \times la multiplication dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

- (a) Il existe au moins un élément de \mathbb{E} inversible dans $(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}), \times)$.
 (b) $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ est l'élément neutre de (\mathbb{E}, \times) .
 (c) $\begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix}$ est l'élément neutre de (\mathbb{E}, \times) .
 (d) (\mathbb{E}, \times) est un groupe commutatif.

EXERCICE 6

Dans le plan complexe muni d'un repère orthonormé direct (O, \vec{u}, \vec{v}) , on considère la transformation σ qui à chaque point $M(z)$ associe le point $M'(z')$ tel que :

$$z' = -3\bar{z} + 4 - 2i.$$

Question 13 σ est alors la composée :

- (a) d'une symétrie axiale et d'une homothétie.
- (b) d'une symétrie axiale et d'une rotation.
- (c) d'une translation et d'une symétrie axiale.
- (d) d'une translation et d'une rotation.

Question 14 Soit C le cercle de centre $I(-1)$ et de rayon 1 et soit $\sigma(C) = C'$, alors :

- (a) C' est le cercle de centre $J(7 - 2i)$ et de rayon 3.
- (b) C' est le cercle de centre $J(7 + 4i)$ et de rayon 3.
- (c) C' est le cercle de centre $J(7 - 2i)$ et qui passe par le point $A(7 + i)$.
- (d) C' est le cercle de centre $J(7 - 4i)$ et qui est tangent à l'axe des abscisses.

EXERCICE 7

On donne trois points A, B et M . On considère les points N milieu de $[AM]$ et P milieu de $[BM]$.

Question 15 On a alors :

- (a) N est l'image de M par l'homothétie de centre A et de rapport $\frac{1}{2}$.
- (b) N est l'image de M par l'homothétie de centre A et de rapport 2.
- (c) P est l'image de N par la translation de vecteur $\frac{1}{2}\vec{AB}$.
- (d) P est l'image de N par la translation de vecteur \vec{AB} .

EXERCICE 8

Dans l'espace euclidien orienté \mathbb{R}^3 , on considère un tétraèdre $ABCD$.

Question 16 L'ensemble des points M tels que

$$\|3\vec{MA} + 2\vec{MB}\| = \|2\vec{MC} + 3\vec{MD}\|.$$

- (a) est un singleton. (b) est une droite. (c) est un plan. (d) est une sphère.

On suppose l'espace muni d'un repère orthonormé et on considère le plan (P) d'équation $x + y + z = 3$,

$$\text{la droite } (D_1) : \begin{cases} x = 1 - 2t \\ y = 1 + t \\ z = 2 + t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}) \text{ et la droite } (D_2) : \begin{cases} x - y = 0 \\ 2x + z = 1 \end{cases}.$$

Question 17 On a alors :

- (a) La droite (D_2) passe par le point de coordonnées $(0, 0, 1)$ et de vecteur directeur de coordonnées $(1, 1, -2)$.
- (b) La droite (D_2) passe par les points de coordonnées $(1, 1, -1)$ et $(2, 2, 3)$.
- (c) Les deux droites sont non coplanaires, $(D_1) \parallel (P)$ et $(D_2) \parallel (P)$.
- (d) Les deux droites sont non coplanaires, $(D_1) \parallel (P)$ et $(D_2) \perp (P)$.

EXERCICE 9

Dans un espace probabilisé (Ω, T, P) on considère deux événements A et B .

Question 18 On suppose que $P(A) = \frac{1}{5}$ et $P(A \cup B) = \frac{1}{2}$, alors :

- (a) Si les deux événements sont incompatibles alors $P(B) = \frac{1}{10}$.
- (b) Si les deux événements sont indépendants alors $P(B) = \frac{3}{8}$.
- (c) Si A ne peut être réalisé que si l'événement B est réalisé alors $P(B) = \frac{1}{2}$.
- (d) Si B est réalisé alors A est aussi réalisé.

EXERCICE 10

Dans un concours la liste d'attente est constituée de n candidats ($n \geq 4$) ordonnés suivant l'ordre de mérite. Deux amis se trouvent dans cette liste. On considère les deux événements :

A : "Les deux amis soient situés l'un après l'autre"

B : "les deux amis soient séparés par un troisième candidats"

Question 19 La probabilité $P(A)$ est :

- (a) $\frac{1}{n}$. (b) $\frac{2}{n}$. (c) $\frac{2}{n(n-1)}$. (d) $\frac{1}{n} + \frac{1}{n-1}$.

Question 20 La probabilité $P(B)$ est :

- (a) $\frac{2}{n(n-1)}$. (b) $\frac{2}{n-1}$. (c) $\frac{2(n-2)}{n(n-1)}$. (d) $\frac{2}{n}$.

Exercice 1

Question 1	<p>On a $u_0 = a$ et $u_{n+1} = \sin(u_n)$</p> <p>Donc $u_0 = a$ et $u_n \leq 1 \quad \forall n \geq 1$</p> <p>Donc $u_n \leq \max(a , 1) \quad \forall n \in \mathbb{N}$</p> <p>Donc (u_n) est bornée</p>	(b)
Question 2	<p>On pose $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = l$</p> <p>On a $u_{n+1} = \sin(u_n)$ et $x \rightarrow \sin(x)$ continue sur \mathbb{R}</p> <p>Alors $l = \sin(l)$</p> <p>Donc $l = 0$</p>	(b)
Question 3	<p>On a</p> $\gamma = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sin^2(x)} - \frac{1}{x^2}$ $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\left(x - \frac{x^3}{6}\right)^2} - \frac{1}{x^2}$ <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin: 10px 0;"> $\sin(u) = u - \frac{u^3}{6} + o(u^3)$ </div> $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2 - \frac{x^4}{3} + \frac{x^6}{36}} - \frac{1}{x^2}$ $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \left(\frac{1}{1 - \left(\frac{x^2}{3} - \frac{x^4}{36}\right)} - 1 \right)$ <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin: 10px 0;"> $\frac{1}{1-u} = 1 + u + o(u)$ </div> $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \left(1 + \left(\frac{x^2}{3} - \frac{x^4}{36}\right) - 1 \right)$ $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \left(\frac{x^2}{3} - \frac{x^4}{36} \right) = \boxed{\frac{1}{3}}$	(b)
Question 4	<p>On a $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sin^2(x)} - \frac{1}{x^2} = \gamma$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$</p> <p>Alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sin^2(u_n)} - \frac{1}{u_n^2} = \gamma$</p> <p>Donc</p> $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{u_{n+1}^2} - \frac{1}{u_n^2} = \gamma$ <p>Donc</p>	

$$\left| \frac{1}{u_{n+1}^2} - \frac{1}{u_n^2} - \gamma \right| < \varepsilon \Rightarrow \sum_{k=0}^{n-1} \left| \frac{1}{u_{k+1}^2} - \frac{1}{u_k^2} - \gamma \right| < \sum_{k=0}^{n-1} \varepsilon$$

$$\Rightarrow \left| \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{u_{k+1}^2} - \frac{1}{u_n^2} - n\gamma \right| < n\varepsilon$$

$$\Rightarrow \left| \frac{1}{u_n^2} - \frac{1}{u_0^2} - n\gamma \right| < n\varepsilon$$

$$\Rightarrow \left| \frac{1}{nu_n^2} - \frac{16}{n\pi^2} - \gamma \right| < \varepsilon$$

Donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{nu_n^2} - \frac{16}{n\pi^2} - \gamma = 0$

Par suite $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{nu_n^2} = \gamma$

donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{\sqrt{\frac{1}{n\gamma}}}{u_n} \right)^2 = 1$

Donc

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{\frac{1}{n\gamma}}}{u_n} = 1$$

Ce qui montre

$$u_n \sim \sqrt{\frac{1}{n\gamma}}$$

d

Exercice 2

On a

$$I_0 = \int_0^1 (1-x)^0 e^{-2x} dx = \int_0^1 e^{-2x} dx = \left[-\frac{e^{-2x}}{2} \right]_0^1 = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} e^{-2}$$

$$I_1 = \int_0^1 (1-x)e^{-2x} dx = \left[-\frac{(1-x)e^{-2x}}{2} \right]_0^1 - \int_0^1 \frac{e^{-2x}}{2} dx = \frac{1}{2} + \left[\frac{e^{-2x}}{4} \right]_0^1$$

$$= \frac{1}{2} + \frac{1}{4} e^{-2} - \frac{1}{4}$$

$$= \frac{1}{4} e^{-2} + \frac{1}{4}$$

(b)

Question 5

- Soit $n \in \mathbb{N}$

On a

$$\begin{aligned} I_{n+1} - I_n &= \int_0^1 (1-x)^{n+1} e^{-2x} dx - \int_0^1 (1-x)^n e^{-2x} dx \\ &= \int_0^1 (1-x)^{n+1} e^{-2x} - (1-x)^n e^{-2x} dx \\ &= \int_0^1 -x(1-x)^n e^{-2x} dx \end{aligned}$$

Or $0 \leq x \leq 1$ alors $-x(1-x)^n e^{-2x} \leq 0$ donc $\int_0^1 -x(1-x)^n e^{-2x} dx \leq 0$

Donc $I_{n+1} \leq I_n$

Alors (I_n) est décroissante

- Pour tout $n \in \mathbb{N}$ on a

$$(1-x)^n e^{-2x} \geq 0 \text{ donc } \int_0^1 (1-x)^n e^{-2x} dx \geq 0 \text{ donc } I_n \geq 0$$

Alors (I_n) est décroissante et minorée par 0

D'où (I_n) est convergente

(b)
et
(d)

Exercice 3

- Soit $n \in \mathbb{N}$ on a

$$\begin{aligned}
 S_n &= \sum_{k=0}^n (-1)^k I_k = \sum_{k=0}^n (-1)^k \int_0^1 t^{2k} dt = \int_0^1 \sum_{k=0}^n (-1)^k \times t^{2k} dt \\
 &= \int_0^1 \sum_{k=0}^n (-t^2)^k dt = \int_0^1 \frac{1 - (-t^2)^{n+1}}{1 - (-t^2)} dt \\
 &= \int_0^1 \frac{1 - (-1)^{n+1} \times (t^2)^{n+1}}{1 + t^2} dt \\
 &= \int_0^1 \frac{1}{1 + t^2} dt - \int_0^1 \frac{(-1)^{n+1} \times (t^2)^{n+1}}{1 + t^2} dt \\
 &= \int_0^1 \frac{1 - (-1)^{n+1} \times (t^2)^{n+1}}{1 + t^2} dt \\
 &= \int_0^1 \frac{1}{1 + t^2} dt - (-1)^{n+1} \times \int_0^1 \frac{(t^2)^{n+1}}{1 + t^2} dt
 \end{aligned}$$

Donc

$$S_n = \int_0^1 \frac{1}{1+t^2} dt - (-1)^{n+1} \times \int_0^1 \frac{(t^2)^{n+1}}{1+t^2} dt$$

$$S_n = \int_0^1 \frac{1}{1+t^2} dt + (-1)^n \times \int_0^1 \frac{(t^2)^{n+1}}{1+t^2} dt$$

(b)
Et
(d)

On a

$$S_n = \int_0^1 \frac{1}{1+t^2} dt - (-1)^{n+1} \times \int_0^1 \frac{(t^2)^{n+1}}{1+t^2} dt$$

Or

$$0 \leq t \leq 1 \Rightarrow 0 \leq \frac{1}{1+t^2} \leq 1 \Rightarrow 0 \leq \frac{t^{2n+2}}{1+t^2} \leq t^{2n+2}$$

$$\Rightarrow 0 \leq \int_0^1 \frac{t^{2n+2}}{1+t^2} dt \leq \int_0^1 t^{2n+2} dt \Rightarrow 0 \leq \int_0^1 \frac{t^{2n+2}}{1+t^2} dt \leq \frac{1}{2n+3}$$

Or $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{2n+3} = 0$ alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 \frac{t^{2n+2}}{1+t^2} dt = 0$

D'où $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \int_0^1 \frac{1}{1+t^2} dt = [\arctan t]_0^1 = \boxed{\frac{\pi}{4}}$

(b)

Exercice 4

Lahcen Oukhdil


Question 10	<ul style="list-style-type: none"> On suppose que $r = \frac{p}{q}$ est une racine de p alors $P(r) = 0 \Rightarrow a_n \left(\frac{p}{q}\right)^n + a_{n-1} \left(\frac{p}{q}\right)^{n-1} + \dots + a_1 \frac{p}{q} + a_0 = 0$ $\Rightarrow a_n p^n + a_{n-1} p^{n-1} q + \dots + a_1 p q^{n-1} + a_0 q^n = 0$ $\Rightarrow a_n p^n = -q(a_{n-1} p^{n-1} + \dots + a_0 q^{n-1}) \quad \text{et} \quad a_0 q^n = -p(a_n p^{n-1} + \dots + a_1 q^{n-1})$ $\Rightarrow q \text{ divise } a_n p^n \quad \text{et} \quad p \text{ divise } a_0 q^n$ <p>Or $p \wedge q = 1$ alors $p \wedge q^n = 1$ et $p^n \wedge q = 1$ Donc d'après Théorème de Gauss</p> <p style="text-align: center;">q divise a_n et p divise a_0</p>	(a) et (c)
ou		

Exercice 5

Question 12	<ul style="list-style-type: none"> Soit $\begin{pmatrix} a & a \\ a & a \end{pmatrix} \in E$, on a $\begin{pmatrix} a & a \\ a & a \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} a & a \\ a & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & a \\ a & a \end{pmatrix}$ <p>Or $\begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix} \in E$</p> <p>Alors $\begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix}$ est l'élément neutre de (E, \times)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> la loi \times associative <input checked="" type="checkbox"/> \times admet élément neutre <input checked="" type="checkbox"/> Tout les élément de E est symétrique <input checked="" type="checkbox"/> la loi \times est commutative <p>Alors (E, \times) est un group commutatif</p>	(c) et (d)
-------------	--	------------------

Exercice 6

Question 13	<p>On a</p> $\sigma(z) = -3\bar{z} + 4 - 2i = f \circ h$ <p>Tel que $f(z) = -3z + 4 - 2i = -3\left(z - 1 + \frac{1}{2}i\right) + 1 - \frac{1}{2}i$ et $g(z) = \bar{z}$</p> <p>Alors f est une homothétie de centre $\Omega\left(1 - \frac{1}{2}i\right)$ et de rapport -3</p> <p>Et est une symétrie axiale (Ox)</p> <p>D'où σ est la composition d'une symétrie axiale et d'une homothétie</p>	(a)
-------------	--	-----

Question 14	<p> ➔ On a $\sigma(I) = J \Rightarrow z_J = -3\bar{z}_I + 4 - 2i = 7 - 2i$ Donc $J(7 - 2i)$ Soit $M(z) \in (C)$ alors $\sigma(M) = M' \in (C')$ i.e $z' = -3\bar{z} + 4 - 2i$ Donc $JM = z_J - z' = 7 - 2i + 3\bar{z} - 4 + 2i = 3 + 3\bar{z} = 3 1 + \bar{z} = 3 1 + z = 3 1 + z = 3$ Car $\bar{z} = z$ et $1 + z = z - (-1) = IM = 1$ Donc (C') est le cercle de centre $J(7 - 2i)$ et de rayon 3 ➔ On a $B(-1 + i) \in (C)$ alors $A = \sigma(B) \in (C')$ Et on a $z_A = -3\bar{z}_B + 4 - 2i = 7 + i$ alors $A(7 + i) \in (C')$ d'où (C') est le cercle de centre $J(7 - 2i)$ et qui passe par le point $A(7 + i)$ </p>	(a) et (c)
Question 15	 <p> • On a N milieu de $[AM]$ alors $\overrightarrow{AN} = \frac{1}{2} \overrightarrow{AM}$ Alors N est l'image de M homothétie de centre A et de rapport $\frac{1}{2}$ • On a $\begin{cases} N \text{ milieu de } [AM] \\ P \text{ milieu de } [BM] \end{cases} \Rightarrow (NP) // (AB) \text{ et } NP = \frac{1}{2} AB$ Donc $\overrightarrow{NP} = \frac{1}{2} \overrightarrow{AB}$ Alors P est l'image de N par la translation de vecteur $\frac{1}{2} \overrightarrow{AB}$ </p>	(a) et (c)
Question 16	<p> On pose $G = \text{bar}(A(3), B(2))$ et $G' = \text{bar}(C(2), D(3))$ Alors $3\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} = 5\overrightarrow{MG}$ et $2\overrightarrow{MC} + 3\overrightarrow{MD} = 5\overrightarrow{MG'}$ Donc $\ 3\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB}\ = \ 2\overrightarrow{MC} + 3\overrightarrow{MD}\ \Rightarrow \ 5\overrightarrow{MG}\ = \ 5\overrightarrow{MG'}\ \Rightarrow 5MG = 5MG' \Rightarrow \boxed{MG = MG'}$ Donc l'ensemble des point M est un plan </p>	©

Question 17	<ul style="list-style-type: none"> On a $(D_2): \begin{cases} x - y = 0 \\ 2x + z = 1 \end{cases}$ On pose $x = t$ donc $(D_2): \begin{cases} x = t \\ y = t \\ z = 1 - 2t \end{cases}$ Alors la droite (D_2) passe par le point de coordonnées $(0, 0, 1)$ et de vecteur directeur de coordonnées $(1, 1, -2)$ <ul style="list-style-type: none"> $\vec{n}(1, 1, 1)$ est un vecteur normal au plan (P) $\vec{u}_1(-2, 1, 1)$ est un vecteur directeur de (D_1) $\vec{u}_2(1, 1, -2)$ est un vecteur directeur de (D_2) Or $\vec{u}_1 \cdot \vec{n} = 0$ et $\vec{u}_2 \cdot \vec{n} = 0$ alors $(D_2) // (P)$ et $(D_1) // (P)$ De plus on a $M(1, 1, 2) \in (D_1)$ et $M(1, 1, 2) \notin (P)$ $N(0, 0, 1) \in (D_2)$ et $N(0, 0, 1) \notin (P)$ Alors les deux droites sont non coplanaires, $(D_2) // (P)$ et $(D_1) // (P)$ 	(a) et (c)
Question 19	$P(A) = \frac{2}{n}$	(c)
Question 20	$P(B) = \frac{2(n-2)}{n(n-1)}$	©